

Tres consejos para manejar ciertos efectos secundarios

1

Tomarlo de noche

Puede tener síntomas similares a la gripe, tales como fiebre, dolor de cabeza o escalofríos. Tomar ACTIMMUNE® (interferón gamma-1b) a la hora de irse a dormir puede ayudarlo con algunos de estos efectos secundarios frecuentes.

2

Reducir la fiebre y el dolor de cabeza

El paracetamol es un analgésico que ayuda a bajar la fiebre y puede conseguir en la farmacia. Tomar paracetamol (por ejemplo, Tylenol®) con ACTIMMUNE® antes de irse a dormir puede ayudarlo a prevenir estos síntomas.

3

Apegarse al cronograma

Es importante tomar ACTIMMUNE® 3 veces por semana, a la misma hora cada día. Con el tiempo, tomar el medicamento regularmente puede atenuar los efectos secundarios frecuentes.

Información importante de seguridad

¿Para qué sirve ACTIMMUNE® (interferón gamma-1b)?

ACTIMMUNE® forma parte de un régimen farmacológico que se utiliza para tratar la enfermedad granulomatosa crónica o EGC. La EGC es un trastorno genético, que generalmente se diagnostica en la niñez, que afecta a algunas células del sistema inmunitario y la capacidad del cuerpo para combatir infecciones de manera eficaz. Con frecuencia, la EGC se trata (aunque no se cura) con antibióticos, antifúngicos y ACTIMMUNE.

ACTIMMUNE también se usa para retrasar el empeoramiento de la osteopetrosis maligna grave (Severe Malignant Osteopetrosis, SMO). La SMO es un trastorno genético que afecta la formación normal de los huesos y, por lo general, se diagnostica durante los primeros meses de vida.

¿Cuándo no debería tomar ACTIMMUNE?

No tome ACTIMMUNE si es alérgico al interferón-gamma, a los productos derivados de *E coli* o a cualquiera de los ingredientes que contiene el producto.

Información de seguridad importante (continuación)

¿Cuáles son las advertencias que debo conocer sobre ACTIMMUNE?

En dosis altas, ACTIMMUNE puede causar síntomas (similares a la gripe) que pueden empeorar algunas afecciones cardíacas preexistentes.

ACTIMMUNE puede causar disminución del estado mental, alteraciones en el andar y mareos, especialmente en dosis muy altas. Estos síntomas suelen ser reversibles en unos pocos días tras la reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento.

La función de la médula ósea puede verse suprimida con ACTIMMUNE, y puede producirse una disminución de la producción de células importantes para el cuerpo. Este efecto, que puede ser grave, suele ser reversible cuando se suspende el medicamento o se reduce la dosis.

Tomar ACTIMMUNE puede causar cambios reversibles en la función hepática, especialmente en pacientes menores de 1 año de edad. Su médico debe monitorear su función hepática cada 3 meses y, todos los meses, en niños menores de 1 año de edad.

En casos poco frecuentes, ACTIMMUNE puede causar reacciones alérgicas o sarpullido graves. Si experimenta una reacción grave a ACTIMMUNE, interrúmpalo inmediatamente y comuníquese con su médico o busque ayuda médica.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica?

Asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que toma.

Informe a su médico si usted:

- está embarazada o piensa quedar embarazada o tiene pensado amamantar;
- tiene una afección cardíaca, tal como latidos irregulares, insuficiencia cardíaca o una disminución del flujo de sangre al corazón;
- tiene antecedentes de convulsiones u otros trastornos neurológicos;
- tiene, o ha tenido, una disminución en la función de la médula ósea. Su médico controlará estas células con análisis de sangre al comienzo del tratamiento y cada 3 meses durante la terapia con ACTIMMUNE.

¿Cuáles son los efectos secundarios de ACTIMMUNE?

Los efectos secundarios más frecuentes de ACTIMMUNE son síntomas "similares a la gripe", tales como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular o fatiga, cuya gravedad puede disminuir a medida que el tratamiento continúa. La administración de ACTIMMUNE a la hora de irse a dormir puede ayudar a reducir algunos de estos síntomas. El paracetamol puede ser útil para prevenir la fiebre y los dolores de cabeza.

¿Qué otros medicamentos pueden interactuar con ACTIMMUNE?

Algunos fármacos pueden interactuar con ACTIMMUNE y aumentar, potencialmente, el riesgo de daño al corazón o al sistema nervioso, como ciertos fármacos de quimioterapia. Infórmeme a su médico sobre todos los otros medicamentos que toma.

Evite recibir ACTIMMUNE al mismo tiempo que una vacuna.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

La información sobre riesgos que se proporciona aquí no es exhaustiva. Para obtener más información, hable sobre ACTIMMUNE con su proveedor de atención médica o farmacéutico. Puede encontrar la etiqueta de los productos aprobados por la FDA en <http://www.ACTIMMUNE.com> o llamando al 1-866-479-6742.



Horizon es propietaria o posee la licencia de los logotipos de las marcas comerciales ACTIMMUNE® y Horizon.
© 2020 Horizon Therapeutics plc P-ACT-00831 12/20

Consulte la información completa de prescripción de ACTIMMUNE® y la información para el paciente/cuidador en ACTIMMUNE.com.