

# Cómo inyectar ACTIMMUNE<sup>®</sup> (Interferón gamma-1b)

**Esta guía es un recordatorio útil de cómo preparar y administrar su terapia**

**No administre ACTIMMUNE<sup>®</sup> hasta que haya sido capacitado por un profesional médico en las técnicas adecuadas.**

## 1

### Prepare sus materiales

- 1 Saque el vial de ACTIMMUNE<sup>®</sup> del refrigerador unos 15 minutos antes de la hora de la inyección, para que esté a temperatura ambiente al inyectarlo.
- 2 Examine el vial para asegurarse de que no ha caducado y que el contenido no se ha decolorado.
- 3 Coloque los siguientes materiales en una superficie limpia y plana:



Torundas con alcohol



Jeringa,  
aguja y vial



Recipiente de objetos  
puntiagudos para  
desechar jeringa y aguja

## 2

### Mida su dosis

1



Lávese las manos con agua y jabón antes de medir su dosis de ACTIMMUNE® (Interferón gamma-1b).

4



Después, inserte cuidadosamente la aguja a través del tapón de caucho y empuje el émbolo hasta el fondo para inyectar el aire en el vial.

2



Quite la tapa de plástico del vial, y limpie la punta del tapón de caucho con una torunda mojada en alcohol.

5



Sujete el vial al revés con una mano, y con la otra, saque lentamente el émbolo hasta la marca correspondiente a la dosis de ACTIMMUNE® que recetó su médico.

3



Saque la jeringa de su paquete. Quite el protector de la aguja y póngalo a un lado. Luego meta aire en la jeringa jalando el émbolo. Jale hasta la marca correspondiente a la dosis de ACTIMMUNE® que recetó su médico.

6



Saque la aguja del vial y vuelva a colocar el protector de la aguja hasta la hora de administración. Luego, deseche el vial según las instrucciones de su médico. Cada vial sirve para un solo uso.

## 3


### Seleccione el sitio de la inyección

Seleccione un sitio que tenga algo de grasa bajo la piel, y asegúrese de ir rotando el sitio con cada inyección para que la piel tenga tiempo de sanar.


Estos son algunos sitios comunes de inyección que puede usar:



Muslo



Brazo



Abdomen\*

\*Si selecciona el abdomen, asegúrese de inyectar al menos a 2 pulgadas (5 cm) del ombligo.

# 4

## Inyecte el medicamento

1



Limpie el sitio de la inyección usando una torunda con alcohol.

2



Quite el protector de la aguja, sujetando la jeringa como un lápiz.

3



Con la otra mano pellizque suavemente la piel donde va a inyectar. Inserte la aguja en la piel a un ángulo de 45° con un movimiento rápido y firme. Esto duele menos que insertarla con lentitud.

4



Cuando la aguja esté adentro, jale el émbolo muy ligeramente con una mano para ver si entra sangre a la jeringa. Si ve sangre, saque la aguja y pruebe de nuevo en otro lugar.

5



Inyecte con cuidado el ACTIMMUNE® (Interferón gamma-1b) empujando suavemente el émbolo hasta vaciar la jeringa. Esto solo debe tomar unos segundos.

6



Después saque la aguja de la piel con un movimiento lento directo hacia afuera. Aplique presión con una torunda de algodón o una gasa, y luego aplique una venda al sitio de la inyección.

# 5

## Limpieza

Cuando termine el proceso de inyección, coloque la aguja y jeringa en su recipiente de objetos puntiagudos y deseche el ACTIMMUNE® no utilizado siguiendo las instrucciones de su médico.

### ¿Tiene preguntas sobre sus inyecciones?

Un educador de enfermería para CGD ofrecido por TranscendRare™, un programa de HorizonCares, con gusto le ayudará.

Llame al **1 (877) 305-7704** durante el horario normal de oficina para comunicarse con un educador de enfermería de CGD o para programar una cita para enseñarle a inyectar en su casa, sin costo alguno. También puede visitar **ACTIMMUNE.com/support** para explorar todos los recursos y herramientas que están a su disposición.

Lea la información para pacientes/cuidadores que está a su disposición en **ACTIMMUNE.com**.

## Información importante de seguridad

### ¿Para qué se usa ACTIMMUNE® (Interferón gamma-1b)?

ACTIMMUNE® forma parte de un régimen de fármacos utilizado para tratar la enfermedad granulomatosa crónica, o EGC. La EGC es un trastorno genético que usualmente se diagnostica en la infancia, que afecta a algunas células del sistema inmune, así como la capacidad del cuerpo para combatir infecciones con eficacia. La EGC a menudo se trata (aunque no se cura) con antibióticos, antimicóticos y ACTIMMUNE.

ACTIMMUNE también se usa para ralentizar el empeoramiento de la osteopetrosis maligna severa (OMS). La OMS es un trastorno genético que afecta la formación normal de los huesos y generalmente se diagnostica en los primeros meses de vida.

### ¿Cuándo no debo tomar ACTIMMUNE?

No use ACTIMMUNE si es alérgico al interferón- gamma, productos derivados de *E coli*, o a cualquiera de los ingredientes contenidos en el producto.

### ¿Qué advertencias debo conocer sobre el ACTIMMUNE?

A dosis altas, ACTIMMUNE puede causar síntomas similares a los de la gripe que pueden empeorar algunos trastornos cardíacos preexistentes.

ACTIMMUNE puede causar un estado mental disminuido, alteraciones en la manera de caminar y mareos, especialmente a dosis muy altas. Estos síntomas usualmente son reversibles en pocos días tras reducir la dosis o suspender la terapia.

La función de la médula ósea puede suprimirse con ACTIMMUNE, y esto puede causar una reducción en la producción de células importantes para el cuerpo. Este efecto, que puede ser severo, usualmente es reversible tras suspender el fármaco o reducir la dosis.

Tomar ACTIMMUNE puede causar cambios reversibles en su función hepática, especialmente en pacientes menores de 1 año de edad. Su médico debe controlar su función hepática cada 3, y cada mes en niños menores de 1 año.

En casos raros, ACTIMMUNE puede causar reacciones alérgicas severas y/o sarpullido. Si experimenta una reacción grave a ACTIMMUNE, suspéndalo de inmediato y hable con su médico o pida asistencia médica.

### ¿Qué debo decirle a mi proveedor de servicios de salud?

Informe a su médico de todos los fármacos que toma.

Informe a su médico si:

- está embarazada, o piensa embarazarse o amamantar
- sufre de un trastorno cardíaco como frecuencia cardíaca irregular, insuficiencia cardíaca o reducción del flujo sanguíneo a su corazón
- tiene historia de convulsiones u otros trastornos neurológicos
- tiene o ha tenido una función reducida de su médula ósea. Su médico controlará estas células con análisis de sangre al iniciar su terapia y a intervalos de 3 meses durante la terapia con ACTIMMUNE.

## Información importante de seguridad (continuación)

### ¿Cuáles son los efectos secundarios de ACTIMMUNE?

Los efectos secundarios más comunes con ACTIMMUNE son síntomas similares a la gripe como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular o fatiga, que pueden disminuir en severidad conforme continúe el tratamiento. La administración de ACTIMMUNE a la hora de dormir puede ayudar a reducir algunos de estos síntomas. El acetaminofén puede ayudar a prevenir la fiebre y los dolores de cabeza.

### ¿Qué otros medicamentos pueden interactuar con ACTIMMUNE?

Algunos fármacos pueden interactuar con ACTIMMUNE para aumentar potencialmente el riesgo de daños a su corazón o sistema nervioso, como ciertos fármacos de quimioterapia. Informe a su médico de todos los otros medicamentos que esté tomando.

### Evite tomar ACTIMMUNE al mismo tiempo que una vacuna.

Lo invitamos a informar los efectos secundarios negativos de fármacos recetados a la FDA. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch), o llame al 1-800-FDA-1088. Puede llamar al Departamento de Información Médica de Horizon Pharma a la línea sin costo 1-866-479-6742 o enviar un mensaje a [medicalinformation@horizonpharma.com](mailto:medicalinformation@horizonpharma.com).

*Esta información sobre riesgos no es exhaustiva. Para obtener más información, hable sobre ACTIMMUNE con su proveedor de servicios de salud o farmacéutico. La etiqueta del producto aprobada por la FDA se encuentra en <http://www.ACTIMMUNE.com> o llame al 1-866-479-6742.*



ACTIMMUNE® es distribuido en EE.UU. por Horizon Pharma USA, Inc.  
Noviembre de 2017 P-ACT-00312